

「打擊登革熱，促進健康生活」學習單

年 班 座號 學生姓名

小朋友，登革熱是由帶病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊叮咬所傳播，去年在高屏地區肆虐，已造成許多病例個案，我們都不希望自己成為下一個感染者。其實要預防登革熱並不容易，只要清除病媒蚊的家，也就是一切所有會積水的容器，就能遠離登革熱的威脅！

一、下面有一些小問題請小朋友來看一看，哪些是蚊子的家？請在□中打✓

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. 廢輪胎 | <input type="checkbox"/> 2. 花瓶、花盆底盤 |
| <input type="checkbox"/> 3. 未加蓋的水桶、鐵桶 | <input type="checkbox"/> 4. 廢棄洗衣機 |
| <input type="checkbox"/> 5. 雨棚積水 | <input type="checkbox"/> 6. 瓶子、鐵罐 |
| <input type="checkbox"/> 7. 未加蓋的水塔 | <input type="checkbox"/> 8. 堆積雜物 |
| <input type="checkbox"/> 9. 樹洞、竹筒 | <input type="checkbox"/> 10. 屋頂排水溝 |

二、是非題

- () 1. 為了防止登革熱，儲水容器不用時要倒放；使用時要加蓋密封。
- () 2. 為了防止登革熱，花瓶內的水每一星期要換水並刷洗一次以上。
- () 3. 樹洞有無積水和登革熱並無多大關係。
- () 4. 盛水容器必須定期檢查並用力刷洗容器內部以清除附著在內部的蟲卵。
- () 5. 無法清除積水的地方，可灑下肥皂粉或食鹽，讓蚊蟲無法生長。

三、下列是感染登革熱時可能發生的症狀：

- | |
|---|
| ① 發燒 ② 肌肉、骨節疼痛 ③ 起紅疹 ④ 嘔吐
⑤ 全身疲倦 ⑥ 腸胃道出血 |
|---|

1. 那些是典型登革熱的症狀，請將上面方格中的代號填入空格中_____。



2. 那些是出血型登革熱的症狀，請將上面方格中的代號填入空格中_____。

※完成學習單的小朋友，記得將學習單交給級任導師喔，謝謝！

登革熱防治宣導資料

一、病媒蚊的篇：

在台灣，會傳播登革熱的蚊子以白線斑蚊、埃及斑蚊兩種為主，它們的分布和習性有所不同：

種類	埃及斑蚊	白線斑蚊
圖片		
生活史	從子到成蟲約 8-9 天	從子到成蟲約 14 天
孳生地	樹洞、積水容器、花瓶、廢輪胎	樹洞、積水容器、花瓶、廢輪胎
食性	白天咬人，多在室內吸血，吸血高峰---下午四、五點。	白天咬人，多在室外吸血，吸血高峰---下午四、五點。
棲息地	室內---衣服、窗簾後、陰暗處。	室外---樹洞、陰涼水邊、竹林。




二、認識登革熱：

登革熱是由病媒蚊引起的一種傳染病，又叫「天狗熱」、「斷骨熱」，但病源並不是直接生長在蚊子身上，而是蚊子先叮了帶病毒的動物，病毒再藉著蚊子來傳染。

但是只要病媒蚊一叮到帶有登革熱的動物，經過8-12 天，這隻蚊子就具有終身傳播病毒的能力。




登革熱的病毒主要有四種，如果不小心重覆感染兩種不同的病毒，就會演變成-----出血型登革熱，死亡率最高達50%。至於感染的症狀有哪些呢？請看以下說明：

(一) 典型登革熱：







<p>1. 發燒</p> 	<p>2. 肌肉、骨節、後眼窩疼痛</p> 	<p>3. 起紅疹</p> 
--	--	---

(二) 出血型登革熱：

(除了以上症狀，又多增加下列症狀)

<p>1. 嘔吐</p> 	<p>2. 全身疲倦</p> 	<p>3. 腸胃道出血</p> 
--	---	---

三、防治篇：

<p>(一) 清除不必要的容器</p> 	<p>(二) 清除戶外廢輪胎、積水容器</p> 
<p>(三) 花瓶、盛水容器每週要清潔一次</p> 	<p>(四) 戶外活動請擦防蚊液</p> 
<p>(五) 家中裝紗窗、紗門，睡覺可掛蚊帳</p> 	<p>(六) 去東南亞旅遊請做好防疫措施</p> 

四、總結：清除積水容器、防治病媒蚊孳生，是預防登革熱最根本的方法。

登革熱宣導學習單


年 班 號 姓名：

中高年級請自行填答，低年級可帶回請家長協助填寫

是非題，對的打 0，錯的打 X



- () 1. 登革熱之病媒蚊是埃及斑蚊和白線斑蚊。
- () 2. 被埃及斑蚊或白線斑蚊叮到就一定會得到登革熱。
- () 3. 感染登革熱的病人在生病期間睡覺應該掛蚊帳，而且要清理住家環境，不讓病媒蚊孳生。
- () 4. 重複感染登革熱會引起出血性登革熱，嚴重者會有生命危險。
- () 5. 防止登革熱應避免白天被埃及斑蚊和白線斑蚊叮咬。
- () 6. 白線斑蚊大多棲息於室外陰暗處，如樹林或竹林內。
- () 7. 埃及斑蚊多棲息在室內，停留於窗簾、衣服及其他陰暗場所。
- () 8. 防治登革熱的根本方法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。
- () 9. 登革熱病媒蚊的幼蟲主要生長在室內外積水容器內(如水缸、廢輪胎、花盤、屋簷、排水溝、樹洞竹洞等)
- () 10. 室內外容易積水的地方，就是登革熱病媒蚊容易孳生的場所。徹底清除積水，保持乾燥，勿堆積雜物，以免孳生子子。



登革熱宣導學習單

年 班 號 姓名：

中高年級請自行填答，低年級可帶回請家長協助填寫

是非題，對的打 0，錯的打 X



- (0) 1. 登革熱之病媒蚊是埃及斑蚊和白線斑蚊。
- (X) 2. 被埃及斑蚊或白線斑蚊叮到就一定會得到登革熱。
- (0) 3. 感染登革熱的病人在生病期間睡覺應該掛蚊帳，而且要清理住家環境，不讓病媒蚊孳生。
- (0) 4. 重複感染登革熱會引起出血性登革熱，嚴重者會有生命危險。
- (0) 5. 防止登革熱應避免白天被埃及斑蚊和白線斑蚊叮咬。
- (0) 6. 白線斑蚊大多棲息於室外陰暗處，如樹林或竹林內。
- (0) 7. 埃及斑蚊多棲息在室內，停留於窗簾、衣服及其他陰暗場所。
- (0) 8. 防治登革熱的根本方法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。
- (0) 9. 登革熱病媒蚊的幼蟲主要生長在室內外積水容器內(如水缸、廢輪胎、花盤、屋簷、排水溝、樹洞竹洞等)
- (0) 10. 室內外容易積水的地方，就是登革熱病媒蚊容易孳生的場所。徹底清除積水，保持乾燥，勿堆積雜物，以免孳生子子。

